

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES  
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum  
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum  
10. Oktober 2002 (10.10.2002)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer  
**WO 02/079195 A1**

(51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: **C07D 405/04**,  
405/14, 213/85, A61K 31/443, 31/4433, 31/444, 31/4439,  
31/4418, C07D 417/14

Mitsuyuki [JP/DE]; Mozartstrasse 31, 40667 Meerbusch  
(DE).

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP02/02998

(74) Gemeinsamer Vertreter: **BAYER AKTIENGE-  
SELLSCHAFT**; 51368 Leverkusen (DE).

(22) Internationales Anmeldedatum:  
19. März 2002 (19.03.2002)

(81) Bestimmungsstaaten (*national*): AE, AG, AL, AM, AT,  
AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR,  
CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE,  
GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR,  
KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK,  
MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU,  
SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,  
US, UZ, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:  
101 15 922.6 30. März 2001 (30.03.2001) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme  
von US): **BAYER AKTIENGESELLSCHAFT** [DE/DE];  
51368 Leverkusen (DE).

(84) Bestimmungsstaaten (*regional*): ARIPO-Patent (GH,  
GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW),  
eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ,  
TM), europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK,  
ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR),  
OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW,  
ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **ROSENTERER**,  
Ulrich [DE/DE]; Obere Rutenbeck 6, 42349 Wuppertal  
(DE). **KRÄMER, Thomas** [DE/DE]; Schneewittchenweg  
37, 42111 Wuppertal (DE). **VAUPEL, Andrea** [DE/CH];  
Dinkelbergstr. 64, CH-4125 Riehen (CH). **HÜBSCH**,  
Walter [DE/DE]; Wildsteig 22, 42113 Wuppertal (DE).  
**DIEDRICHS, Nicole** [DE/DE]; Laurentiusstrasse 12,  
42103 Wuppertal (DE). **KRAHN, Thomas** [DE/DE];  
Wiener Strasse 29, 58135 Hagen (DE). **DEMBOWSKY**,  
Klaus [DE/US]; 289 Shawmut Avenue, Boston, MA  
02116 (US). **STASCH, Johannes-Peter** [DE/DE]; Al-  
fred-Nobel-Str. 109, 42651 Solingen (DE). **SHIMADA**,


**Erklärung gemäß Regel 4.17:**

— hinsichtlich der Berechtigung des Anmelders, ein Patent zu  
beantragen und zu erhalten (Regel 4.17 Ziffer ii) für die  
folgenden Bestimmungsstaaten AE, AG, AL, AM, AT, AU,  
AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU,  
CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH,  
GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC,  
LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX,  
MZ, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI,  
SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, UZ, VN, YU, ZA,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: SUBSTITUTED 2-THIO-3,5-DICYANO-4-PHENYL-6-AMINOPYRIDINES WITH ADENOSINE RECEPTOR-BINDING ACTIVITY AND THEIR USE AS CARDIOVASCULAR PREPARATIONS

(54) Bezeichnung: SUBSTITUIERTE 2-THIO-3,5-DICYANO-4-PHENYL-6-AMINOPYRIDINE MIT ADENOSINREZEPTOR-BINDENDER WIRKUNG UND IHRE VERWENDUNG ALS HERZ-KREISLAUF-MITTEL



(I)

(57) Abstract: The invention relates to the compounds of formula (I), to a method for producing them and to their use as medicaments.

(57) Zusammenfassung: Es werden Verbindungen der Formel (I) beschrieben, ein Verfahren zu ihrer Herstellung sowie ihre Verwendung als Arzneimittel.

WO 02/079195 A1



ZM, ZW, ARIPO-Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG)

**Veröffentlicht:**

— mit internationalem Recherchenbericht

— vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

**Cyclisch substituierte 2-Thio-3,5-dicyano-4-aryl-6-aminopyridine und ihre Verwendung**

Die vorliegende Erfindung betrifft neue 2-Thio-3,5-dicyano-4-aryl-6-aminopyridine,  
5 ein Verfahren zu ihrer Herstellung und ihre Verwendung als Arzneimittel.

Adenosin, ein Nucleosid aus Adenin und D-Ribose, ist ein endogener Faktor mit zellprotektiver Wirksamkeit, insbesondere unter zellschädigenden Bedingungen mit begrenzter Sauerstoff- und Substratversorgung, wie z.B. bei Ischämie in verschieden-  
10 sten Organen (z.B. Herz und Gehirn).

Adenosin entsteht intrazellulär beim Abbau von Adenosin-5'-monophosphat (AMP) und S-Adenosylhomocystein als Zwischenprodukt, kann jedoch aus der Zelle freigesetzt werden und übt dann durch Bindung an spezifische Rezeptoren Funktionen  
15 als hormonähnliche Substanz oder Neurotransmitter aus.

Unter normoxischen Bedingungen ist die Konzentration des freien Adenosin im Extrazellulärraum sehr niedrig. Die extrazelluläre Konzentration von Adenosin erhöht sich in den betroffenen Organen jedoch dramatisch unter ischämischen bzw.  
20 hypoxischen Bedingungen. So ist beispielsweise bekannt, dass Adenosin die Thrombozyten-Aggregation hemmt und die Durchblutung der Herzkranzgefäße steigert. Weiterhin wirkt es auf die Herzfrequenz, auf die Ausschüttung von Neurotransmittern und auf die Lymphozyten-Differenzierung.

25 Diese Wirkungen von Adenosin zielen darauf ab, das Sauerstoffangebot der betroffenen Organe zu erhöhen bzw. den Stoffwechsel dieser Organe zu drosseln, um damit unter ischämischen oder hypoxischen Bedingungen eine Anpassung des Organstoffwechsels an die Organdurchblutung zu erreichen.

30 Die Wirkung von Adenosin wird über spezifische Rezeptoren vermittelt. Bekannt sind bisher die Subtypen A1, A2a, A2b und A3. Die Wirkungen dieser Adenosin-

Rezeptoren werden intrazellulär durch den Botenstoff cAMP vermittelt. Im Falle der Bindung von Adenosin an die A2a- oder A2b-Rezeptoren kommt es über eine Aktivierung der membranständigen Adenylatzyklase zu einem Anstieg des intrazellulären cAMP, während die Bindung des Adenosin an die A1- oder A3-Rezeptoren über eine Hemmung der Adenylatzyklase eine Abnahme des intrazellulären cAMP-Gehalts bewirkt.

Als "Adenosinrezeptor-selektive Liganden" werden erfindungsgemäß solche Substanzen bezeichnet, die selektiv an einen oder mehrere Subtypen der Adenosinrezeptoren binden und dabei entweder die Wirkung des Adenosin nachahmen (Adenosin-Agonisten) oder dessen Wirkung blockieren (Adenosin-Antagonisten) können.

Adenosinrezeptor-selektive Liganden lassen sich nach ihrer Rezeptorselektivität in verschiedene Klassen einteilen, so z.B. in Liganden, die selektiv an die A1- oder die A2-Rezeptoren des Adenosin binden, bei letzteren auch beispielsweise solche, die selektiv an die A2a- oder die A2b-Rezeptoren des Adenosin binden. Auch sind Adenosinrezeptor-Liganden möglich, die selektiv an mehrere Subtypen der Adenosinrezeptoren binden, so z.B. Liganden, die selektiv an die A1- und an die A2-, jedoch nicht an die A3-Rezeptoren des Adenosin binden.

Die zuvor genannte Rezeptor-Selektivität lässt sich bestimmen durch die Wirkung der Substanzen an Zelllinien, die nach stabiler Transfektion mit der entsprechenden cDNA die jeweiligen Rezeptorsubtypen exprimieren (siehe hierzu die Druckschrift M.E. Olah, H. Ren, J. Ostrowski, K.A. Jacobson, G.L. Stiles, "Cloning, expression, and characterization of the unique bovine A1 adenosine receptor. Studies on the ligand binding site by site-directed mutagenesis." in J. Biol. Chem. 267 (1992) Seiten 10764-10770, deren Offenbarung hiermit im vollen Umfang durch Bezugnahme eingeschlossen ist).


Die Wirkung der Substanzen an solchen Zelllinien lässt sich erfassen durch biochemische Messung des intrazellulären Botenstoffes cAMP (siehe hierzu die Druck-

schrift K.N. Klotz, J. Hessling, J. Hegler, C. Owman, B. Kull, B.B. Fredholm, M.J. Lohse, "Comparative pharmacology of human adenosine receptor subtypes - characterization of stably transfected receptors in CHO cells" in Naunyn Schmiedeberts Arch. Pharmacol. 357 (1998) Seiten 1-9, deren Offenbarung hiermit im vollen  
5      Umfang durch Bezugnahme eingeschlossen ist).

Bei den aus dem Stand der Technik bekannten, als "adenosinrezeptor-spezifisch" geltenden Liganden handelt es sich überwiegend um Derivate auf Basis des natürlichen Adenosins (S.-A. Poulsen und R.J. Quinn, "Adenosine receptors: new opportunities for future drugs" in Bioorganic and Medicinal Chemistry 6 (1998) Seiten 619-641; K. J. Broadley, "Drugs modulating adenosine receptors as potential therapeutic agents for cardiovascular diseases" in Exp. Opin. Ther. Patents 10 (2000) Seiten 1669-1692). Die aus dem Stand der Technik bekannten Adenosin-Liganden haben jedoch meistens den Nachteil, dass sie nicht wirklich rezeptorspezifisch wirken, schwächer wirksam sind als das natürliche Adenosin oder nach oraler Applika-  
10      tion nur sehr schwach wirksam sind. Daher werden sie aufgrund der zuvor genannten Nachteile überwiegend nur für experimentelle Zwecke verwendet.  
15

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, pharmakologisch aktive Substanzen auf-  
20      zufinden oder bereitzustellen, die für die Prophylaxe und/oder Behandlung verschiedenster Erkrankungen, insbesondere Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems (kardiovaskuläre Erkrankungen), geeignet sind und dabei vorzugsweise als Adenosinrezeptor-selektive Liganden wirken.

Die vorliegende Erfindung betrifft Verbindungen der Formel (I),



worin

5

$R^1$  und  $R^2$  an benachbarte Phenylringatome gebunden sind und mit den beiden Ringkohlenstoffatomen gemeinsam einen 5- bis 7-gliedrigen gesättigten oder partiell ungesättigten Ring bilden, der ein oder zwei Heteroatome aus der Reihe N, O und/oder S enthalten kann und der ein- oder zweifach, unabhängig voneinander, durch (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkyl, das seinerseits durch Hydroxy, (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkoxy oder Phenyl substituiert sein kann, Cyano, Halogen oder Oxo substituiert sein kann,

10

$R^3$  (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl, das bis zu dreifach, unabhängig voneinander, durch Hydroxy, (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkoxy, (C<sub>3</sub>-C<sub>7</sub>)-Cycloalkyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkenyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkinyl, Halogen oder (C<sub>6</sub>-C<sub>10</sub>)-Aryloxy substituiert sein kann, (C<sub>6</sub>-C<sub>10</sub>)-Aryl, das bis zu dreifach, unabhängig voneinander, durch Halogen, Nitro, (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkoxy, Carboxyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkoxycarbonyl oder Mono- oder Di-(C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-alkylamino substituiert sein kann, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkoxy, das durch Hydroxy, (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkoxy, (C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>)-Cycloalkyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkenyl, (C<sub>6</sub>-C<sub>10</sub>)-Aryl, 5- bis 10-gliedriges Heteroaryl mit bis zu drei Heteroatomen aus der Reihe N, O und/oder S, (C<sub>6</sub>-C<sub>10</sub>)-Aryloxy, Halogen, Cyano, (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkoxycarbonyl, Amino oder Mono- oder Di-(C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-alkylamino substituiert sein kann, Wasserstoff, Hydroxy, Halogen, Nitro, Cyano oder -NH-C(O)-  $R^5$  bedeutet,

15

20

25



worin

5             $R^5$          $(C_1-C_8)$ -Alkyl, das durch Hydroxy oder  $(C_1-C_4)$ -Alkoxy substituiert sein kann,  $(C_3-C_7)$ -Cycloalkyl oder  $(C_6-C_{10})$ -Aryl, das bis zu dreifach, unabhängig voneinander, durch Halogen, Nitro,  $(C_1-C_4)$ -Alkoxy, Carboxyl,  $(C_1-C_4)$ -Alkoxycarbonyl oder Mono- oder Di- $(C_1-C_4)$ -alkylamino substituiert sein kann, bedeutet,

und

10

$R^4$          $(C_2-C_4)$ -Alkenyl,  $(C_3-C_7)$ -Cycloalkyl oder  $(C_1-C_8)$ -Alkyl bedeutet, wobei Alkyl bis zu dreifach, unabhängig voneinander, durch Halogen, Trifluormethyl, Trifluormethylthio,  $(C_3-C_7)$ -Cycloalkyl, Hydroxy,  $-CO-NH-R^6$ ,  $(C_1-C_4)$ -Alkoxy,  $(C_1-C_4)$ -Alkoxycarbonyl,  $(C_2-C_4)$ -Alkenyl,  $(C_6-C_{10})$ -Aryl oder 5- bis 10-gliedriges Heteroaryl mit bis zu drei Heteroatomen und/oder Hetero-Kettenglieder aus der Reihe N, NO (N-Oxid), O und/oder S substituiert sein kann,

15

wobei

20

Aryl und Heteroaryl ihrerseits bis zu dreifach, unabhängig voneinander, durch Halogen, Trifluormethyl,  $(C_1-C_4)$ -Alkyl, das seinerseits durch Carboxyl oder  $(C_1-C_4)$ -Alkoxycarbonyl substituiert sein kann,  $(C_1-C_4)$ -Alkoxy, Carboxyl,  $(C_1-C_4)$ -Alkoxycarbonyl, Amino, Mono- oder Di- $(C_1-C_4)$ -alkylamino, Nitro, Cyano oder Hydroxy substituiert sein können,

25

und

30

$R^6$         Wasserstoff,  $(C_1-C_8)$ -Alkyl, das durch Hydroxy oder  $(C_1-C_4)$ -Alkoxy substituiert sein kann,  $(C_3-C_7)$ -Cycloalkyl oder  $(C_6-C_{10})$ -Aryl, das bis

zu dreifach, unabhängig voneinander, durch Halogen, Nitro, (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkoxy, Carboxyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkoxycarbonyl oder Mono- oder Di-(C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-alkylamino substituiert sein kann, bedeutet,

5 und ihre Salze, Hydrate, Hydrate der Salze und Solvate.

Die Verbindungen der Formel (I) können in Abhängigkeit vom Substitutionsmuster in stereoisomeren Formen, die sich entweder wie Bild und Spiegelbild (Enantiomere) oder die sich nicht wie Bild und Spiegelbild (Diastereomere) verhalten, existieren. Die  
10 Erfindung betrifft sowohl die Enantiomeren oder Diastereomeren als auch deren jeweilige Mischungen. Die Racemformen lassen sich ebenso wie die Diastereomeren in bekannter Weise in die stereoisomer einheitlichen Bestandteile trennen. Gleichmaßen betrifft die vorliegende Erfindung auch die Tautomeren der Verbindungen der Formel (I).

15 Salze der Verbindungen der Formel (I) können physiologisch unbedenkliche Salze der erfindungsgemäßen Stoffe mit Mineralsäuren, Carbonsäuren oder Sulfonsäuren sein. Besonders bevorzugt sind z.B. Salze mit Chlorwasserstoffsäure, Bromwasserstoffsäure, Schwefelsäure, Phosphorsäure, Methansulfonsäure, Ethansulfonsäure, Toluolsulfon-  
20 säure, Benzolsulfonsäure, Naphthalindisulfonsäure, Trifluoressigsäure, Essigsäure, Propionsäure, Milchsäure, Weinsäure, Zitronensäure, Fumarsäure, Maleinsäure oder Benzoessäure.

Als Salze können auch Salze mit üblichen Basen genannt werden, wie beispielsweise  
25 Alkalimetallsalze (z.B. Natrium- oder Kaliumsalze), Erdalkalisalze (z.B. Calcium- oder Magnesiumsalze) oder Ammoniumsalze, abgeleitet von Ammoniak oder organischen Aminen wie beispielsweise Diethylamin, Triethylamin, Ethyldiisopropylamin, Prokain, Dibenzylamin, N-Methylmorpholin, Dihydroabietylamin, 1-Ephenamin oder Methyl-  
piperidin.

30



Als Hydrate bzw. Solvate werden erfindungsgemäß solche Formen der Verbindungen der Formel (I) bezeichnet, welche in festem oder flüssigem Zustand durch Hydratation mit Wasser oder Koordination mit Lösungsmittelmolekülen eine Molekül-Verbindung bzw. einen Komplex bilden. Beispiele für Hydrate sind Sesquihydrate, Monohydrate, Dihydrate oder Trihydrate. Gleichmaßen kommen auch die Hydrate bzw. Solvate von Salzen der erfindungsgemäßen Verbindungen in Betracht.

Außerdem umfasst die Erfindung auch Prodrugs der erfindungsgemäßen Verbindungen. Als Prodrugs werden erfindungsgemäß solche Formen der Verbindungen der Formel (I) bezeichnet, welche selbst biologisch aktiv oder inaktiv sein können, jedoch unter physiologischen Bedingungen in die entsprechende biologisch aktive Form überführt werden können (beispielsweise metabolisch oder solvolytisch).

Im Rahmen der vorliegenden Erfindung haben die Substituenten, soweit nicht anders angegeben, die folgende Bedeutung:

Halogen steht im Allgemeinen für Fluor, Chlor, Brom oder Iod. Bevorzugt sind Fluor, Chlor oder Brom. Ganz besonders bevorzugt sind Fluor oder Chlor.

(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-Alkyl bzw. (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkyl steht im Allgemeinen für einen geradkettigen oder verzweigten Alkylrest mit 1 bis 8, 1 bis 6 bzw. 1 bis 4 Kohlenstoffatomen. Bevorzugt ist ein geradkettiger oder verzweigter Alkylrest mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen. Besonders bevorzugt ist ein geradkettiger oder verzweigter Alkylrest mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen. Beispielsweise seien genannt: Methyl, Ethyl, n-Propyl, Isopropyl, n-Butyl, sec-Butyl, Isobutyl und tert.-Butyl.

(C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkenyl stehen im Allgemeinen für einen geradkettigen oder verzweigten Alkenylrest mit 2 bis 4 Kohlenstoffatomen. Beispielsweise seien genannt: Vinyl, Allyl, Isopropenyl und n-But-2-en-1-yl.

(C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkynyl steht im Allgemeinen für einen geradkettigen oder verzweigten Alkynylrest mit 2 bis 4 Kohlenstoffatomen. Beispielsweise seien genannt: Ethinyl, n-Prop-2-in-1-yl und n-But-2-in-1-yl.

- 5 (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkoxy, (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-Alkoxy bzw. (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkoxy steht im Allgemeinen für einen geradkettigen oder verzweigten Alkoxyrest mit 1 bis 8, 1 bis 6 bzw. 1 bis 4 Kohlenstoffatomen. Bevorzugt ist ein geradkettiger oder verzweigter Alkoxyrest mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen. Besonders bevorzugt ist ein geradkettiger oder verzweigter Alkoxyrest mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen. Beispielsweise seien genannt: Methoxy,  
10 Ethoxy, n-Propoxy, Isopropoxy, n-Butoxy, Isobutoxy, sec-Butoxy, tert.-Butoxy.

- (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkoxycarbonyl steht im Allgemeinen für einen geradkettigen oder verzweigten Alkoxyrest mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen, der über eine Carbonylgruppe verknüpft ist. Beispielsweise seien genannt: Methoxycarbonyl, Ethoxycarbonyl, n-  
15 Propoxycarbonyl, Isopropoxycarbonyl und t-Butoxycarbonyl.

- Mono- oder Di-(C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-alkylamino steht im Rahmen der Erfindung für eine Amino-Gruppe mit einem oder mit zwei gleichen oder verschiedenen geradkettigen oder verzweigten Alkylsubstituenten, die jeweils 1 bis 4 Kohlenstoffatome aufweisen.  
20 Beispielsweise seien genannt: Methylamino, Ethylamino, n-Propylamino, Isopropylamino, t-Butylamino, *N,N*-Dimethylamino, *N,N*-Diethylamino, *N*-Ethyl-*N*-methylamino, *N*-Methyl-*N*-n-propylamino, *N*-Isopropyl-*N*-n-propylamino und *N*-t-Butyl-*N*-methylamino.

- 25 (C<sub>3</sub>-C<sub>7</sub>)-Cycloalkyl bzw. (C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>)-Cycloalkyl steht im Allgemeinen für einen cyclischen Alkylrest mit 3 bis 7 bzw. 3 bis 6 Kohlenstoffatomen. Bevorzugt sind cyclische Alkylreste mit 3 bis 6 Kohlenstoffatomen. Beispielsweise seien genannt: Cyclopropyl, Cyclobutyl, Cyclopentyl oder Cyclohexyl.

- 30 (C<sub>6</sub>-C<sub>10</sub>)-Aryl steht im Allgemeinen für einen aromatischen Rest mit 6 bis 10 Kohlenstoffatomen. Bevorzugte Arylreste sind Phenyl und Naphthyl.

(C<sub>6</sub>-C<sub>10</sub>)-Aryloxy steht im Allgemeinen für einen wie zuvor definierten aromatischen Rest, der über ein Sauerstoffatom verknüpft ist.

- 5 5- bis 10-gliedriges Heteroaryl mit bis zu 3 Heteroatomen und/oder Hetero-Kettenglieder aus der Reihe N, NO (N-Oxid), O und/oder S steht im Allgemeinen für einen mono- oder bicyclischen, gegebenenfalls benzokondensierten Heteroaromaten, der über ein Ringkohlenstoffatom des Heteroaromaten, gegebenenfalls auch über ein Ringstickstoffatom des Heteroaromaten, verknüpft ist. Beispielsweise seien genannt: Pyridyl, Pyridyl-N-oxid, Pyrimidyl, Pyridazinyl, Pyrazinyl, Thienyl, Furyl, Pyrrolyl, Pyrazolyl, Imidazolyl, Triazolyl, Thiazolyl, Oxazolyl, Oxdiazolyl, Isoxazolyl, Benzofuranyl, Benzothienyl oder Benzimidazolyl. Aus dieser Definition leiten sich analog die entsprechenden Heteroaromaten mit weniger Heteroatomen wie z.B. mit einem oder 2 Heteroatomen aus der Reihe N, O und/oder S oder geringerer Ringgröße wie z.B. 5- oder 6-gliedriges Heteroaryl ab. Im Allgemeinen gilt, dass 5- oder 6-gliedrige aromatische Heterocyclen mit einem oder 2 Heteroatomen aus der Reihe N, O und/oder S bevorzugt sind. Beispielsweise seien genannt: Pyridyl, Pyrimidyl, Pyridazinyl, Furyl, Imidazolyl oder Thienyl.
- 10
- 15
- 20 5- bis 7-gliedriger Heterocyclus steht im Allgemeinen für einen gesättigten oder teilweise ungesättigten, gegebenenfalls benzokondensierten Heterocyclus mit bis zu 3 Heteroatomen aus der Reihe N, O und/oder S. Beispielsweise seien genannt: Tetrahydrofuryl, Pyrrolidinyl, Pyrrolinyl, Dihydropyridinyl, Piperidinyl, Piperazinyl, Morpholinyl, Thiomorpholinyl, Hexahydropyranyl. Aus dieser Definition leiten sich analog die entsprechenden Heterocyclen mit weniger Heteroatomen wie z.B. mit einem oder 2 Heteroatomen aus der Reihe N, O und/oder S oder geringerer Ringgröße wie z.B. 5- oder 6-gliedriges Heterocyclyl ab. Bevorzugt sind gesättigte Heterocyclen mit bis zu 2 Heteroatomen aus der Reihe N, O und/oder S, insbesondere Piperidinyl, Piperazinyl, Morpholinyl und Pyrrolidinyl.
- 25

Bevorzugt sind Verbindungen der Formel (I),

worin

5       $R^1$  und  $R^2$  an benachbarte Phenylringatome gebunden sind und mit den beiden Ring-  
kohlenstoffatomen gemeinsam einen 5- bis 7-gliedrigen gesättigten Ring  
bilden, der ein oder zwei Heteroatome aus der Reihe N und/oder O enthalten  
kann und der ein- oder zweifach, unabhängig voneinander, durch Methyl, das  
seinerseits durch Hydroxy, (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkoxy oder Phenyl substituiert sein  
10 kann, Fluor oder Chlor substituiert sein kann,

$R^3$       Wasserstoff oder Chlor bedeutet

und

15

$R^4$       (C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkenyl oder (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkyl bedeutet, wobei Alkyl bis zu zweifach,  
unabhängig voneinander, durch Halogen, Trifluormethyl, Trifluormethylthio,  
(C<sub>3</sub>-C<sub>7</sub>)-Cycloalkyl, Hydroxy, -CO-NH- $R^6$ , (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkoxy, (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkoxy-  
carbonyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkenyl, (C<sub>6</sub>-C<sub>10</sub>)-Aryl oder 5- oder 6-gliedriges Heteroaryl  
20 mit bis zu drei Heteroatomen aus der Reihe N, O und/oder S substituiert sein  
kann,

wobei

25

Aryl und Heteroaryl ihrerseits bis zu dreifach, unabhängig voneinander, durch  
Halogen, Trifluormethyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkyl, das seinerseits durch  
Carboxyl oder (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkoxycarbonyl substituiert sein kann,  
(C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkoxy, Carboxyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkoxycarbonyl, Nitro, Cyano  
oder Hydroxy substituiert sein können,

30

und

$R^6$  Wasserstoff oder  $(C_1-C_4)$ -Alkyl bedeutet,



und ihre Salze, Hydrate, Hydrate der Salze und Solvate.

5

Besonders bevorzugt sind Verbindungen der Formel (I),

worin

10  $R^1$  und  $R^2$  an benachbarte Phenylringatome gebunden sind und für eine Gruppe



15  $R^3$  Wasserstoff bedeutet

und

20  $R^4$  Propenyl, Methyl, Ethyl oder n-Propyl bedeutet, wobei die Alkylreste ihrerseits bis zu zweifach, unabhängig voneinander, durch Hydroxy, Methoxy, Trifluor-methyl, Trifluormethylthio, Fluor, Imidazolyl, Pyridyl, Phenyl, das seinerseits wiederum durch Fluor, Cyano, Nitro, Methoxy, Methoxycarbonyl ( $-C(O)-O-CH_3$ ) oder Methoxycarbonylmethyl ( $-CH_2-C(O)-O-CH_3$ ) substituiert sein kann, Methoxycarbonyl ( $-C(O)-O-CH_3$ ), Amido ( $-C(O)-NH_2$ ) oder  
25 N-Methylamido ( $-C(O)-NH-CH_3$ ) substituiert sein können,

und ihre Salze, Hydrate, Hydrate der Salze und Solvate.


Ebenfalls besonders bevorzugt sind Verbindungen der Formel (I), worin  $R^1$  und  $R^2$  an benachbarte Phenylringatome gebunden sind, die sich in para und meta-Position zur Anknüpfungsstelle des Pyridinrings befinden.

5

Ebenfalls besonders bevorzugt sind Verbindungen der Formel (I),

worin

10  $R^1$  und  $R^2$  an benachbarte Phenylringatome gebunden sind und für eine Gruppe



$R^3$  Wasserstoff bedeutet,

15

und

$R^4$  Propenyl, Methyl, Ethyl oder n-Propyl bedeutet, wobei die Alkylreste ihrerseits bis zu zweifach, unabhängig voneinander, durch Hydroxy, Methoxy, Trifluormethyl, Trifluormethylthio, Fluor, Imidazolyl, gegebenenefalls durch Methyl substituiertes Thiazolyl, Pyridyl, Phenyl, das seinerseits wiederum durch Fluor, Cyano, Nitro, Methoxy, Methoxycarbonyl ( $-\text{C}(\text{O})-\text{O}-\text{CH}_3$ ) oder Methoxycarbonylmethyl ( $-\text{CH}_2-\text{C}(\text{O})-\text{O}-\text{CH}_3$ ) substituiert sein kann, Methoxycarbonyl ( $-\text{C}(\text{O})-\text{O}-\text{CH}_3$ ), Amido ( $-\text{C}(\text{O})-\text{NH}_2$ ) oder N-Methylamido ( $-\text{C}(\text{O})-\text{NH}-\text{CH}_3$ ) substituiert sein können,

20

25




und ihre Salze, Hydrate, Hydrate der Salze und Solvate.

Ebenfalls besonders bevorzugt sind Verbindungen der Formel (I),

5 worin

$R^1$  und  $R^2$  an benachbarte Phenylringatome gebunden sind und für eine Gruppe



10

$R^3$  Wasserstoff bedeutet,

und

15  $R^4$  Methyl, Ethyl oder n-Propyl bedeutet, wobei die Alkylreste ihrerseits bis zu zweifach, unabhängig voneinander, durch Hydroxy, Trifluormethyl, Trifluormethylthio, Fluor, Imidazolyl, gegebenenfalls durch Methyl substituiertes Thiazolyl, Phenyl, das seinerseits wiederum durch Cyano, Nitro, Methoxycarbonyl ( $-\text{C}(\text{O})-\text{O}-\text{CH}_3$ ) oder Methoxycarbonylmethyl ( $-\text{CH}_2-\text{C}(\text{O})-\text{O}-\text{CH}_3$ ) substituiert ist, oder Amido ( $-\text{C}(\text{O})-\text{NH}_2$ ) substituiert  
 20 sein können,

und ihre Salze, Hydrate, Hydrate der Salze und Solvate.


25 Ebenfalls besonders bevorzugt sind die Verbindungen der Beispiele 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,

44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 und ihre Salze, Hydrate, Hydrate der Salze und Solvate.

5 Die oben aufgeführten allgemeinen oder in Vorzugsbereichen aufgeführten Restdefinitionen bzw. Erläuterungen können untereinander, also auch zwischen den jeweiligen Bereichen und Vorzugsbereichen, beliebig kombiniert werden. Sie gelten für die Endprodukte sowie für die Vor- und Zwischenprodukte entsprechend.

10 Die vorliegende Erfindung betrifft weiterhin ein Verfahren zur Herstellung der Verbindungen der Formel (I), dadurch gekennzeichnet, dass man

Verbindungen der Formel (II)



15

in welcher

die Reste  $R^1$ ,  $R^2$  und  $R^3$  die oben angegebene Bedeutung haben,

20 in einem Lösemittel, gegebenenfalls in Anwesenheit einer Base, mit Verbindungen der Formel (III)




25 in welcher

$R^4$  die oben angegebene Bedeutung hat und

X für eine Abgangsgruppe wie beispielsweise Halogen, insbesondere Chlor, Brom oder Iod, oder Mesylat, Tosylat, Triflat oder 1-Imidazolyl steht,

5 umsetzt.

Das zuvor beschriebene Verfahren kann durch folgendes Formelschema beispielhaft erläutert werden:



Als Lösemittel für das erfindungsgemäße Verfahren eignen sich alle organischen Lösemittel, die unter den Reaktionsbedingungen inert sind. Hierzu gehören Alkohole wie Methanol, Ethanol und Isopropanol, Ketone wie Aceton und Methylethylketon, acyclische und cyclische Ether wie Diethylether und Tetrahydrofuran, Ester wie Essigsäureethylester oder Essigsäurebutylester, Kohlenwasserstoffe wie Benzol, Xylol, Toluol, Hexan oder Cyclohexan, Dimethylformamid, Acetonitril, Pyridin, Dimethylsulfoxid (DMSO), chlorierte Kohlenwasserstoffe wie Dichlormethan, Chlorbenzol oder Dichlorethan. Wasser ist als Lösemittel ebenso geeignet. Bevorzugt ist Dimethylformamid. Ebenso ist es möglich, Gemische der zuvor genannten Löse-

15

20

mittel einzusetzen.

Als Basen eignen sich die üblichen anorganischen oder organischen Basen. Hierzu gehören bevorzugt Alkalihydroxide wie beispielsweise Natrium- oder Kaliumhydroxid oder Alkalicarbonat wie Natrium- oder Kaliumcarbonat oder Natrium-

25

oder Kaliumhydrogencarbonat oder Natrium- oder Kaliummethanolat oder Natrium- oder Kaliummethanolat oder Kalium-tert.-butylat oder aber Amide wie Natriumamid, Lithium-bis-(trimethylsilyl)amid oder Lithiumdiisopropylamid oder metallorganische Verbindungen wie Butyllithium oder Phenyllithium oder aber auch Amine wie Triethylamin und Pyridin. Bevorzugt sind die Alkalicarbonate oder -hydrogencarbonate, insbesondere Natriumcarbonat oder Natriumhydrogencarbonat.

Die Base kann hierbei in einer Menge von 1 bis 10 Mol, bevorzugt von 1 bis 5 Mol, insbesondere 1 bis 4 Mol, bezogen auf 1 Mol der Verbindungen der Formel (II) eingesetzt werden.

Die Reaktion erfolgt im Allgemeinen in einem Temperaturbereich von -78°C bis +120°C, bevorzugt im Bereich von -78°C bis +40°C, insbesondere bei Raumtemperatur.

Die Umsetzung kann bei normalem, erhöhtem oder erniedrigtem Druck durchgeführt werden (z.B. im Bereich von 0,5 bis 5 bar). Im Allgemeinen arbeitet man bei Normaldruck.

Verbindungen der Formel (III) sind kommerziell erhältlich, dem Fachmann bekannt oder nach literaturüblichen Methoden herstellbar.


Verbindungen der Formel (II) sind dem Fachmann bekannt oder nach literaturüblichen Methoden herstellbar. Insbesondere kann auf die folgenden Druckschriften verwiesen werden, deren jeweiliger Inhalt durch Bezugnahme eingeschlossen wird:

- Dyachenko et al., Russian Journal of Chemistry, Vol. 33, No. 7, 1997, Seiten 1014-1017 und Vol. 34, No. 4, 1998, Seiten 557-563;
- Dyachenko et al., Chemistry of Heterocyclic Compounds, Vol. 34, No. 2, 1998, Seiten 188-194;

- Qintela et al., European Journal of Medicinal Chemistry, Vol. 33, 1998, Seiten 887-897;
- Kandeel et al., Zeitschrift für Naturforschung 42b, 107-111 (1987).

5 Verbindungen der Formel (II) können darüber hinaus beispielsweise auch aus Verbindungen der Formel (IV) durch Umsetzung mit einem Alkalisulfid hergestellt werden.

10 Diese Herstellungsmethode kann durch folgendes Formelschema beispielhaft erläutert werden:



15 Als Alkalisulfid wird vorzugsweise Natriumsulfid in einer Menge von 1 bis 10 Mol, bevorzugt 1 bis 5 Mol, insbesondere 1 bis 4 Mol, bezogen auf 1 Mol der Verbindungen der Formel (IV) eingesetzt.

20 Als Lösungsmittel geeignet sind alle organischen Lösungsmittel, die unter den Reaktionsbedingungen inert sind. Hierzu gehören N,N-Dimethylformamid, N-Methylpyrrolidinon, Pyridin und Acetonitril. Bevorzugt ist N,N-Dimethylformamid. Ebenso ist es möglich, Gemische der zuvor genannten Lösungsmittel einzusetzen.

Die Reaktion erfolgt im Allgemeinen in einem Temperaturbereich von +20°C bis +150°C, bevorzugt im Bereich von +20°C bis +120°C, insbesondere bei +60°C bis +100°C.

- 5 Die Umsetzung kann bei normalem, erhöhtem oder erniedrigtem Druck durchgeführt werden (z.B. im Bereich von 0,5 bis 5 bar). Im Allgemeinen arbeitet man bei Normaldruck.

- 10 Verbindungen der Formel (IV) sind dem Fachmann bekannt oder nach üblichen, literaturbekannten Methoden herstellbar. Insbesondere kann auf die Druckschrift Kambe et al., Synthesis, 531 (1981) verwiesen werden, deren Inhalt durch Bezugnahme eingeschlossen wird.

- 15 Überraschenderweise zeigen die Verbindungen der Formel (I) ein nicht vorhersehbares pharmakologisches Wirkspektrum und sind daher insbesondere zur Prophylaxe und/oder Behandlung von Erkrankungen geeignet.

- 20 Die Verbindungen der Formel (I) sind zur Prophylaxe und/oder Behandlung einer ganzen Reihe von Erkrankungen geeignet, so beispielsweise insbesondere von Erkrankungen des Herzkreislaufsystems (kardiovaskulären Erkrankungen).

- 25 Im Sinne der vorliegenden Erfindung sind unter Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems bzw. kardiovaskulären Erkrankungen beispielsweise insbesondere die folgenden Erkrankungen zu verstehen: Koronare Herzkrankheit, Hypertonie (Bluthochdruck), Restenose wie z.B. Restenose nach Ballondilatation von peripheren Blutgefäßen, Arteriosklerose, Tachykardien, Arrhythmien, periphere und kardiale Gefäß-erkrankungen, stabile und instabile Angina pectoris und Vorhofflimmern.

- 30 Weiterhin eignen sich die Verbindungen der Formel (I) beispielsweise insbesondere auch zur Reduktion des von einem Infarkt betroffenen Myokardbereichs.



Des weiteren eignen sich die Verbindungen der Formel (I) beispielsweise insbesondere zur Prophylaxe und/oder Behandlung von thromboembolischen Erkrankungen und Ischämien wie Myokardinfarkt, Hirnschlag und transitorischen ischämischen Attacken.

5

Weitere Indikationsgebiete, für das sich die Verbindungen der Formel (I) eignen, sind beispielsweise insbesondere die Prophylaxe und/oder Behandlung von Erkrankungen des Urogenitalbereiches, wie z.B. Reizblase, erektile Dysfunktion und weibliche sexuelle Dysfunktion, daneben aber auch die Prophylaxe und/oder  
10 Behandlung von inflammatorischen Erkrankungen, wie z.B. Asthma und entzündlichen Dermatosen, von neuroinflammatorischen Erkrankungen des Zentralnervensystems, wie beispielsweise Zustände nach Hirninfarkt, der Alzheimer-Erkrankung, weiterhin auch von neurodegenerative Erkrankungen wie der Parkinson-Erkrankung, sowie von Schmerzzuständen und Krebs.

15

Ein weiteres Indikationsgebiet sind beispielsweise insbesondere die Prophylaxe und/oder Behandlung von Erkrankungen der Atemwege wie beispielsweise Asthma, chronische Bronchitis, Lungenemphysem, Bronchiektasen, zystische Fibrose (Mukoviszidose) und pulmonale Hypertonie.

20

Des weiteren kommen die Verbindungen der Formel (I) auch beispielsweise insbesondere für die Prophylaxe und/oder Behandlung von Leberfibrose und Leberzirrhose in Betracht.

25

Schließlich kommen die Verbindungen der Formel (I) beispielsweise insbesondere auch für die Prophylaxe und/oder Behandlung von Diabetes, insbesondere Diabetes mellitus, in Betracht.

30

Die vorliegende Erfindung betrifft auch die Verwendung der Substanzen der Formel (I) zur Herstellung von Arzneimitteln und pharmazeutischen Zusammensetzungen zur Prophylaxe und/oder Behandlung der zuvor genannten Krankheitsbilder.

Die vorliegende Erfindung betrifft weiterhin ein Verfahren zur Prophylaxe und/oder Behandlung der zuvor genannten Krankheitsbilder mit den Substanzen der Formel (I).

5

Die pharmazeutische Wirksamkeit der zuvor genannten Verbindungen der Formel (I) lässt sich durch ihre Wirkung als selektive Liganden an einzelnen oder mehreren Subtypen der Adenosin-Rezeptoren, insbesondere als selektive Liganden an Adenosin-A1-, Adenosin-A2a- und/oder Adenosin-A2b-Rezeptoren, vorzugsweise als  
10 selektive Liganden an Adenosin-A1- und/oder Adenosin-A2b-Rezeptoren erklären.

Als "selektiv" werden im Rahmen der vorliegenden Erfindung solche Adenosin-rezeptor-Liganden bezeichnet, bei denen einerseits eine deutliche Wirkung an einem oder mehreren Adenosin-Rezeptor-Subtypen und andererseits keine oder eine deutlich schwächere Wirkung an einem oder mehreren anderen Adenosin-Rezeptor-Subtypen zu beobachten ist, wobei bezüglich der Testmethoden für die Wirk-Selektivität Bezug genommen wird auf die im Abschnitt A. II. beschriebenen Testmetho-  
15 den.

20 Ein Vorteil der erfindungsgemäßen Verbindungen der Formel (I) ist, dass sie gegenüber Adenosinrezeptor-Liganden des Standes der Technik selektiver wirken.

Insbesondere wirken Verbindungen der Formel (I), worin  $R^1$  und  $R^2$  für eine Gruppe  $-O-CH_2-O-$ ,  $-O-CH_2-CH_2-O-$  oder  $-O-CH(CH_2OH)-CH_2-O-$  stehen, im Allgemeinen  
25 agonistisch an Adenosin-A1-Rezeptoren.

Insbesondere wirken Verbindungen der Formel (I), worin  $R^1$  und  $R^2$  für eine Gruppe  $-O-CF_2-O-$  stehen, im Allgemeinen antagonistisch an Adenosin-A1-Rezeptoren.

30 Die Rezeptorselektivität kann bestimmt werden durch die biochemische Messung des intrazellulären Botenstoffes cAMP in den transfizierten Zellen, die spezifisch nur

einen Subtyp der Adenosinrezeptoren exprimieren. Im Falle von A2a- bzw. A2b-Agonisten (Kopplung bevorzugt über Gs-Proteine) wird dabei ein Anstieg des intrazellulären cAMP-Gehaltes, im Falle von A2a- bzw. A2b-Antagonisten eine Abnahme des intrazellulären cAMP-Gehaltes nach Vorstimulation mit Adenosin oder Adenosin ähnlichen Substanzen beobachtet (siehe Druckschriften B. Kull, G. Arslan, C. Nilsson, C. Owman, A. Lorenzen, U. Schwabe, B.B. Fredholm, "Differences in the order of potency for agonists but not antagonists at human and rat adenosine A2A receptors", Biochem. Pharmacol., 57 (1999) Seiten 65-75; und S.P. Alexander, J. Cooper, J. Shine, S.J. Hill, "Characterization of the human brain putative A2B adenosine receptor expressed in Chinese hamster ovary (CHO.A2B4) cells", Br. J. Pharmacol., 119 (1996) Seiten 1286-90, deren jeweilige Offenbarung hiermit durch Bezugnahme eingeschlossen ist). Entsprechend führen A1-Agonisten (Kopplung bevorzugt über Gi-Proteine) zu einer Abnahme und A1-Antagonisten zu einem Anstieg im cAMP-Gehalt.

So eignen sich Verbindungen der Formel (I), die selektiv an Adenosin-A1-Rezeptoren binden, bevorzugt zur Myokard-Protektion und zur Prophylaxe und/oder Behandlung von Tachykardien, Vorhof-Arrhythmien, Herzinsuffizienz, Herzinfarkt, akutem Nierenversagen, Diabetes, sowie von Schmerzzuständen.

Verbindungen der Formel (I), die selektiv an Adenosin-A2a-Rezeptoren binden, sind bevorzugt zur Prophylaxe und/oder Behandlung von thrombo-embolischen Erkrankungen, von neurodegenerativen Erkrankungen wie Morbus Parkinson sowie zur Wundheilung geeignet.

Verbindungen der Formel (I), die selektiv an Adenosin-A2b-Rezeptoren binden, eignen sich bevorzugt zur Prophylaxe und/oder Therapie der Leberfibrose, des Herzinfarkts, von neuroinflammatorischen Erkrankungen, der Alzheimer-Erkrankung, von urogenitaler Inkontinenz sowie von Atemwegserkrankungen wie beispielsweise Asthma und chronischer Bronchitis.

Weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung sind Arzneimittel und pharmazeutische Zusammensetzungen, die mindestens eine Verbindung der Formel (I), vorzugsweise zusammen mit einem oder mehreren pharmakologisch unbedenklichen Hilfs- oder Trägerstoffen enthalten, sowie deren Verwendung zu den zuvor genannten Zwecken.

Für die Applikation der Verbindungen der Formel (I) kommen alle üblichen Applikationsformen in Betracht, d.h. also oral, parenteral, inhalativ, nasal, sublingual, rektal, lokal, wie z.B. bei Templaten oder Stents, oder äußerlich wie z.B. transdermal. Bei der parenteralen Applikation sind insbesondere intravenöse, intramuskuläre, subkutane Applikation zu nennen, z.B. als subkutanes Depot. Besonders bevorzugt ist die orale Applikation.

Hierbei können die Wirkstoffe allein oder in Form von Zubereitungen verabreicht werden. Für die orale Applikation eignen sich als Zubereitungen u.a. Tabletten, Kapseln, Pellets, Dragees, Pillen, Granulate, feste und flüssige Aerosole, Sirupe, Emulsionen, Suspensionen und Lösungen. Hierbei muss der Wirkstoff in einer solchen Menge vorliegen, dass eine therapeutische Wirkung erzielt wird. Im Allgemeinen kann der Wirkstoff in einer Konzentration von 0,1 bis 100 Gew.-%, insbesondere 0,5 bis 90 Gew.-%, vorzugsweise 5 bis 80 Gew.-%, vorliegen, d.h. der Wirkstoff sollte in Mengen vorliegen, die ausreichend sind, den angegebenen Dosierungsspielraum zu erreichen.

Zu diesem Zweck können die Wirkstoffe in an sich bekannter Weise in die üblichen Zubereitungen überführt werden. Dies geschieht unter Verwendung inerter, nicht-toxischer, pharmazeutisch geeigneter Trägerstoffe, Hilfsstoffe, Lösungsmittel, Vehikel, Emulgatoren und/oder Dispergiermittel.

Als Hilfsstoffe seien beispielsweise aufgeführt: Wasser, nichttoxische organische Lösungsmittel wie z.B. Paraffine, pflanzliche Öle (z.B. Sesamöl), Alkohole (z.B. Ethanol, Glycerin), Glykole (z.B. Polyethylenglykol), feste Trägerstoffe wie natür-

liche oder synthetische Gesteinsmehle (z.B. Talkum oder Silikate), Zucker (z.B. Milchzucker), Emulgiermittel, Dispergiermittel (z.B. Polyvinylpyrrolidon) und Gleitmittel (z.B. Magnesiumsulfat).

5 Im Falle der oralen Applikation können Tabletten auch allgemein übliche Zusätze wie Natriumcitrat zusammen mit Zuschlagstoffen wie Stärke, Gelatine und dergleichen enthalten. Wässrige Zubereitungen für die orale Applikation können weiterhin mit Geschmacksaufbesserern oder Farbstoffen versetzt werden.

10 Im Allgemeinen hat es sich als vorteilhaft erwiesen, bei parenteraler Applikation Mengen von etwa 0,1 bis etwa 10 000 µg/kg, vorzugsweise etwa 1 bis etwa 1 000 µg/kg, insbesondere etwa 1 µg/kg bis etwa 100 µg/kg Körpergewicht, zur Erzielung wirksamer Ergebnisse zu verabreichen. Bei oraler Applikation beträgt die Menge etwa 0,1 bis etwa 10 mg/kg, vorzugsweise etwa 0,5 bis etwa 5 mg/kg, insbe-  
15 sondere etwa 1 bis etwa 4 mg/kg Körpergewicht.

In Abhängigkeit von Körpergewicht, Applikationsweg, individuellem Verhalten gegenüber dem Wirkstoff, Art der Zubereitung und Zeitpunkt bzw. Intervall, zu welchem die Applikation erfolgt, kann es gegebenenfalls erforderlich sein, von den  
20 genannten Mengen abzuweichen.

Die vorliegende Erfindung wird an den folgenden Beispielen veranschaulicht, die die Erfindung jedoch keinesfalls beschränken.

## **A. Bewertung der physiologischen Wirksamkeit**

### **I. Nachweis der kardiovaskulären Wirkung**

#### **5 Langendorff-Herz der Ratte:**

Narkotisierten Ratten wird nach Eröffnung des Brustkorbes das Herz entnommen und in eine konventionelle Langendorff-Apparatur eingeführt. Die Koronararterien werden volumenkonstant (10 ml/min) perfundiert und der dabei auftretende  
10 Perfusionsdruck wird über einen entsprechenden Druckaufnehmer registriert. Eine Abnahme des Perfusionsdrucks in dieser Anordnung entspricht einer Relaxation der Koronararterien. Gleichzeitig wird über einen in die linke Herzkammer eingeführten Ballon und einen weiteren Druckaufnehmer der Druck gemessen, der vom Herzen während jeder Kontraktion entwickelt wird. Die Frequenz des isoliert schlagenden  
15 Herzens wird rechnerisch aus der Anzahl der Kontraktionen pro Zeiteinheit ermittelt.

### **II. Nachweis der Rezeptorselektivität**

#### **a) Adenosin-A1-, A2a-, A2b- und A3-Rezeptorselektivität**

20

Zellen der permanenten Linie CHO (Chinese Hamster Ovary) werden stabil mit der cDNA für die Adenosin-Rezeptor-Subtypen A1, A2a, A2b und A3 transfiziert. Die Bindung der Substanzen an die A2a- oder A2b-Rezeptorsubtypen wird bestimmt durch Messung des intrazellulären cAMP-Gehaltes in diesen Zellen mit einem kon-  
25 ventionellen radioimmunologischen Assay (cAMP-RIA).

Im Falle der Wirkung der Substanzen als Agonisten kommt es als Ausdruck der Bindung der Substanzen zu einem Anstieg des intrazellulären cAMP-Gehaltes. Als Referenzverbindung dient in diesen Experimenten die Adenosin-analoge Verbindung  
30 NECA (5-N-Ethylcarboxamido-adenosin), die nicht selektiv, aber mit hoher Affinität an alle Adenosin-Rezeptor-Subtypen bindet und eine agonistische Wirkung besitzt



(Klotz, K.N., Hessling, J., Hegler, J., Owman, C., Kull, B., Fredholm, B.B., Lohse, M.J., Comparative pharmacology of human adenosine receptor subtypes - characterization of stably transfected receptors in CHO cells, Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol, 357 (1998), 1-9).

5

Die Adenosin-Rezeptoren A1 und A3 sind an ein Gi-Protein gekoppelt, d.h. eine Stimulation dieser Rezeptoren führt zu einer Inhibition der Adenylatcyclase und somit zu einer Senkung des intrazellulären cAMP-Spiegels. Zur Identifizierung von A1/A3-Rezeptor-Agonisten wird die Adenylatcyclase mit Forskolin stimuliert. Eine  
10 zusätzliche Stimulation der A1/A3-Rezeptoren hemmt jedoch die Adenylatcyclase, so dass A1/A3-Rezeptor-Agonisten über einen vergleichsweise geringen Gehalt der Zelle an cAMP detektiert werden können.

Für den Nachweis einer antagonistischen Wirkung an Adenosin-Rezeptoren werden  
15 die mit dem entsprechenden Rezeptor transfizierten, rekombinanten Zellen mit NECA vorstimuliert und die Wirkung der Substanzen auf eine Reduktion des intrazellulären cAMP-Gehalts durch diese Vorstimulation untersucht. Als Referenzverbindung dient in diesen Experimenten XAC (xanthine amine congener), die nicht selektiv, aber mit hoher Affinität an alle Adenosinrezeptor-Subtypen bindet und eine  
20 antagonistische Wirkung besitzt (Müller, C.E., Stein, B., Adenosine receptor antagonists: structures and potential therapeutic applications, Current Pharmaceutical Design, 2 (1996), 501-530).

#### **b) Adenosin-A1-, A2a-, A2b- Rezeptorselektivität**

25

Zellen der permanenten Linie CHO (Chinese Hamster Ovary) werden stabil mit der cDNA für die Adenosin-Rezeptor-Subtypen A1, A2a, A2b transfiziert. Die Adenosin A1 Rezeptoren sind über G<sub>i</sub>-Proteine und die Adenosin A2a und A2b Rezeptoren über G<sub>s</sub>-Proteine an die Adenylatcyclase gekoppelt. Entsprechend wird die cAMP-  
30 Bildung in der Zelle inhibiert bzw. stimuliert. Über einen cAMP-abhängigen Promotor wird danach die Expression der Luziferase moduliert. Der Luciferase-Test

wird mit dem Ziel hoher Sensitivität und Reproduzierbarkeit, geringer Varianz und guter Eignung für die Durchführung auf einem Robotersystem optimiert durch Variation mehrerer Testparameter, wie z.B. Zelldichte, Dauer der Anzuchtphase und der Testinkubation, Forskolin-Konzentration, Medium-Zusammensetzung. Zur pharmakologischen Charakterisierung der Zellen und zum Roboter-gestützten Substanztest-Screening wird das folgende Testprotokoll verwendet:

Die Stammkulturen wird in DMEM/F12 Medium mit 10 % FCS (fötales Kälberserum) bei 37°C unter 5 % CO<sub>2</sub> gezüchtet und jeweils nach 2-3 Tagen 1:10 gesplittet. Testkulturen werden von 1000 bis 3000 Zellen pro Napf in 384-well Platten ausgesät und ca. 48 Stunden bei 37°C angezogen. Dann wird das Medium durch eine physiologische Kochsalzlösung (130 mM NaCl, 5 mM KCl, 2 mM CaCl<sub>2</sub>, 20 mM HEPES, 1 mM MgCl<sub>2</sub>•6H<sub>2</sub>O, 5 mM NaHCO<sub>3</sub>, pH 7,4) ersetzt. Die in DMSO gelösten Substanzen werden 3 mal 1:10 mit dieser physiologischen Kochsalzlösung verdünnt und zu den Testkulturen pipettiert (maximale DMSO-Endkonzentration im Testansatz: 0,5 %) So erhält man Substanzendkonzentrationen von beispielsweise 5 µM bis 5 nM. 10 Minuten später wird Forskolin zu den A1 Zellen zugegeben und anschließend werden alle Kulturen für 4 Stunden bei 37°C inkubiert. Danach wird zu den Testkulturen 35 µl Lösung, bestehend zu 50 % aus Lysereagenz (30 mM di-Natriumhydrogenphosphat, 10 % Glycerin, 3 % TritonX100, 25 mM TrisHCl, 2 mM Dithiotreitol (DTT), pH 7,8) und zu 50 % aus Luciferase Substrat Lösung (2,5 mM ATP, 0,5 mM Luciferin, 0,1 mM Coenzym A, 10 mM Tricin, 1,35 mM MgSO<sub>4</sub>, 15 mM DTT, pH 7,8) zugegeben, ca. 1 Minute geschüttelt und die Luciferase-Aktivität mit einem Kamerasystem gemessen.

## B. Ausführungsbeispiele

### Verwendete Abkürzungen:


DMSO	Dimethylsulfoxid
d. Th.	der Theorie
HPLC	Hochdruck-, Hochleistungsflüssigchromatographie
NMR	Kernresonanzspektroskopie
DMF	Dimethylformamid
i. V.	im Vakuum

5

### Beispiel 1

#### 2-Amino-4-(1,3-benzodioxol-5-yl)-6-(2-hydroxyethyl)sulfanyl-3,5-pyridin-dicarbonitril

10



15

75 mg (0,19 mmol) 2-Amino-4-(1,3-benzodioxol-5-yl)-6-sulfanyl-3,5-pyridindicarbonitril [hergestellt analog zu Dyachenko et al., Russian Journal of Chemistry 33 (7), 1014-1017 (1997); 34 (4), 557-563 (1998)] werden in 1 ml DMF zusammen mit 47 mg (0,38 mmol) 2-Bromethanol und 63 mg (0,75 mmol) Natriumhydrogencarbonat über Nacht bei Raumtemperatur gerührt. Dann wird Wasser zugegeben und das ausgefallene Produkt abgesaugt und i.V. getrocknet.

Ausbeute: 55 mg (85,8 % d. Th.)


Massenspektrum: gesuchte Molmasse 340, gefunden  $[M+H]^+ = 341$

$^1\text{H}$ -NMR-Spektrum  $[\text{DMSO}-d_6]$ :  $\delta = 3,4$  [2H] tr; 3,65 [2H] q; 5,0 [1H] tr; 6,15 [2H] s; 7,0 - 7,2 [3H] m; 7,8 - 8,2 [2H] s breit.

5

### Beispiel 2

**2-Amino-4-(1,3-benzodioxol-5-yl)-6-(benzylsulfanyl)-3,5-pyridindicarbonitril**



10

Die Umsetzung wurde analog zu Beispiel 1 durchgeführt.

Ausbeute: 74 mg (100 % d. Th.)


Massenspektrum: gesuchte Molmasse 386, gefunden  $[M+H]^+ = 387$

$^1\text{H}$ -NMR-Spektrum  $[\text{DMSO}-d_6]$ :  $\delta = 4,5$  [2H] s; 6,15 [2H] s; 7,0 - 7,2 [3H] m; 7,3 - 7,6 [5H] m; 7,8 - 8,2 [2H] s breit.

15

### Beispiel 3

**2-Amino-4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-yl)-6-[(2-pyridinylmethyl)sulfanyl]-3,5-pyridindicarbonitril**



5

Die Umsetzung wurde analog zu Beispiel 1 durchgeführt.

Ausbeute: 50 mg (79 % d. Th.)

Massenspektrum: gesuchte Molmasse 423, gefunden  $[M+H]^+ = 424$


<sup>1</sup>H-NMR-Spektrum [DMSO-d<sub>6</sub>]:  $\delta = 4,6$  [2H] s; 6,8 [1H] m; 6,95 [1H] dd; 7,6 - 7,8 [4H] m; 7,9 - 8,4 [2H] s breit; 8,55 [1H] d.

10

### Beispiel 4

**2-Amino-6-(benzylsulfanyl)-4-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)-3,5-pyridindicarbonitril**

15



100 mg (0,32 mmol) 2-Amino-6-sulfanyl-4-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)-3,5-pyridindicarbonitril [hergestellt analog zu Dyachenko et al., Russian Journal of Chemistry 33 (7), 1014-1017 (1997); 34 (4), 557-563 (1998)] werden in 2 ml DMF zusammen mit 110 mg (0,64 mmol) Benzylbromid und 108 mg (1,29 mmol) Natriumhydrogencarbonat 5,5 h bei Raumtemperatur gerührt. Dann wird Wasser zugegeben und dreimal mit Ethylacetat extrahiert. Die vereinigten organischen Phasen werden mit Magnesiumsulfat getrocknet und i.V. eingedampft. Der Rückstand wird in Diethylether aufgenommen und ergibt nach erneutem Eindampfen kristallines Produkt.


10 Ausbeute: 106 mg (82 % d. Th.)

Massenspektrum: gesuchte Molmasse 400, gefunden  $[M+H]^+ = 401$

$^1\text{H-NMR-Spektrum}$  [DMSO- $d_6$ ]:  $\delta = 4,3$  [4H] m; 4,5 [2H] s; 6,9 - 7,1 [3H] m; 7,2 - 7,4 [3H] m; 7,5 [2H] m; 7,8 - 8,2 [2H] s breit.

### 15 Beispiel 5

**2-Amino-6-((2-hydroxyethyl)sulfanyl)-4-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)-3,5-pyridindicarbonitril**



20

Die Umsetzung wurde analog zu Beispiel 1 durchgeführt.

Ausbeute: 15 mg (13 % d. Th.)

Massenspektrum: gesuchte Molmasse 354, gefunden  $[M+H]^+ = 355$


$^1\text{H-NMR-Spektrum}$  [DMSO- $d_6$ ]:  $\delta = 3,4$  [2H] tr; 3,65 [2H] q; 4,3 [4H] s; 5,0 [1H] tr; 7,0 - 7,1 [3H] m; 7,8 - 8,1 [2H] s breit.

25



### Beispiel 6

#### 2-Amino-6-[(2-hydroxyethyl)sulfanyl]-4-[2-(hydroxymethyl)-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl]-3,5-pyridindicarbonitril



30 mg (0,09 mmol) 2-Amino-6-sulfanyl-4-[2-(hydroxymethyl)-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl]-3,5-pyridindicarbonitril [hergestellt analog zu Dyachenko et al., Russian Journal of Chemistry 33 (7), 1014-1017 (1997); 34 (4), 557-563 (1998)]  
 10 werden in 1,5 ml DMF zusammen mit 22 mg (0,18 mmol) 2-Hydroxyethylbromid und 29 mg (0,35 mmol) Natriumhydrogencarbonat über Nacht bei Raumtemperatur gerührt. Die Reaktionslösung wird direkt durch präparative HPLC an Reversed Phase-Kieselgel gereinigt.


Ausbeute: 2,1 mg (6 % d. Th.)

15 Massenspektrum: gesuchte Molmasse 384, gefunden  $[M+H]^+ = 385$

$^1\text{H}$ -NMR-Spektrum  $[\text{DMSO}-d_6]$ :  $\delta = 3,3$  [2H] tr; 3,65 [4H] m; 4,05 [1H] dd; 4,3 [1H] m; 4,4 [1H] dd; 5,0 [1H] tr; 5,15 [1H] trm; 7,0 - 7,1 [3H] m; 7,8 - 8,1 [2H] s breit.

### Beispiel 7

**2-Amino-6-[benzylsulfanyl]-4-[2-(hydroxymethyl)-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl]-3,5-pyridindicarbonitril**



5

Die Umsetzung wurde analog zu Beispiel 6 durchgeführt.





Ausbeute: 4,6 mg (12 % d. Th.)

Massenspektrum: gesuchte Molmasse 430, gefunden  $[M+H]^+ = 431$





10 <sup>1</sup>H-NMR-Spektrum [DMSO-d<sub>6</sub>]: δ = 3,7 [2H] m; 4,05 [1H] dd; 4,3 [1H] m; 4,4 [1H] dd; 4,5 [2H] s; 5,1 [1H] tr; 7,0 - 7,1 [3H] m; 7,2-7,6 [5H] m; 7,8 - 8,1 [2H] s breit.





Die in der folgenden Tabelle aufgeführten Verbindungen (Beispiel 8 bis 54) werden analog hergestellt. Die Identität der Verbindungen wird durch LC-MS nachgewiesen.

15





Beispiel Nr.	Struktur	gesuchte Molmasse	gefundenes [M+H] <sup>+</sup>
8		411	412
9		397	398
10		431	432
11		376	377

Beispiel Nr.	Struktur	gesuchte Molmasse	gefundenes [M+H] <sup>+</sup>
12		368	369
13		390	391
14		376	377
15		387	388





Beispiel Nr.	Struktur	gesuchte Molmasse	gefundenes [M+H] <sup>+</sup>
16		367	368
17		387	388
18		424	425
19		422	423





Beispiel Nr.	Struktur	gesuchte Molmasse	gefundenes [M+H] <sup>+</sup>
20		401	402
21		354	355
22		354	355
23		336	337










Beispiel Nr.	Struktur	gesuchte Molmasse	gefundenes [M+H] <sup>+</sup>
24		342	343
25		387	388
26		411	412
27		404	405

Beispiel Nr.	Struktur	gesuchte Molmasse	gefundenes [M+H] <sup>+</sup>
28		458	459
29		356	357
30		431	432
31		367	368




Beispiel Nr.	Struktur	gesuchte Molmasse	gefundenes [M+H] <sup>+</sup>
32		324	325
33		353	354
34		392	393
35		368	369




Beispiel Nr.	Struktur	gesuchte Molmasse	gefundenes [M+H] <sup>+</sup>
36		385	386
37		376	377
38		384	385
39		336	337



Beispiel Nr.	Struktur	gesuchte Molmasse	gefundenes [M+H] <sup>+</sup>
40		340	341
41		398	399
42		412	413
43		412	413

Beispiel Nr.	Struktur	gesuchte Molmasse	gefundenes [M+H] <sup>+</sup>
44		390	391
45		390	391
46		386	387




Beispiel Nr.	Struktur	gesuchte Molmasse	gefundenes [M+H] <sup>+</sup>
47		422	423
48		429	430
49		449	450

Beispiel Nr.	Struktur	gesuchte Molmasse	gefundenes [M+H] <sup>+</sup>
50		429	430
51		405	406
52		382	383

Beispiel Nr.	Struktur	gesuchte Molmasse	gefundenes [M+H] <sup>+</sup>
53		382	383
54		415	416

## Patentansprüche

### 1. Verbindungen der Formel (I)



5

worin

10

$R^1$  und  $R^2$  an benachbarte Phenylringatome gebunden sind und mit den beiden Ringkohlenstoffatomen gemeinsam einen 5- bis 7-gliedrigen gesättigten oder partiell ungesättigten Ring bilden, der ein oder zwei Heteroatome aus der Reihe N, O und/oder S enthalten kann und der ein- oder zweifach, unabhängig voneinander, durch (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkyl, das seinerseits durch Hydroxy, (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkoxy oder Phenyl substituiert sein kann, Cyano, Halogen oder Oxo substituiert sein kann,

15

20

$R^3$  (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl, das bis zu dreifach, unabhängig voneinander, durch Hydroxy, (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkoxy, (C<sub>3</sub>-C<sub>7</sub>)-Cycloalkyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkenyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkynyl, Halogen oder (C<sub>6</sub>-C<sub>10</sub>)-Aryloxy substituiert sein kann, (C<sub>6</sub>-C<sub>10</sub>)-Aryl, das bis zu dreifach, unabhängig voneinander, durch Halogen, Nitro, (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkoxy, Carboxyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkoxy-carbonyl oder Mono- oder Di-(C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-alkylamino substituiert sein kann, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkoxy, das durch Hydroxy, (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkoxy, (C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>)-Cycloalkyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkenyl, (C<sub>6</sub>-C<sub>10</sub>)-Aryl, 5- bis 10-gliedriges Heteroaryl mit bis zu drei Heteroatomen aus der Reihe N, O und/oder

25

S, (C<sub>6</sub>-C<sub>10</sub>)-Aryloxy, Halogen, Cyano, (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkoxycarbonyl, Amino oder Mono- oder Di-(C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-alkylamino substituiert sein kann, Wasserstoff, Hydroxy, Halogen, Nitro, Cyano oder -NH-C(O)- R<sup>5</sup> bedeutet,

5

worin

10

R<sup>5</sup> (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl, das durch Hydroxy oder (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkoxy substituiert sein kann, (C<sub>3</sub>-C<sub>7</sub>)-Cycloalkyl oder (C<sub>6</sub>-C<sub>10</sub>)-Aryl, das bis zu dreifach, unabhängig voneinander, durch Halogen, Nitro, (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkoxy, Carboxyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkoxycarbonyl oder Mono- oder Di-(C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-alkylamino substituiert sein kann, bedeutet,

15

und

20

R<sup>4</sup> (C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkenyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>7</sub>)-Cycloalkyl oder (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl bedeutet, wobei Alkyl bis zu dreifach, unabhängig voneinander, durch Halogen, Trifluormethyl, Trifluormethylthio, (C<sub>3</sub>-C<sub>7</sub>)-Cycloalkyl, Hydroxy, -CO-NH-R<sup>6</sup>, (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkoxy, (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkoxycarbonyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkenyl, (C<sub>6</sub>-C<sub>10</sub>)-Aryl oder 5- bis 10-gliedriges Heteroaryl mit bis zu drei Heteroatomen und/oder Hetero-Kettenglieder aus der Reihe N, NO (N-Oxid), O und/oder S substituiert sein kann,

25

wobei

30

Aryl und Heteroaryl ihrerseits bis zu dreifach, unabhängig voneinander, durch Halogen, Trifluormethyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkyl, das seinerseits durch Carboxyl oder (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkoxycarbonyl substituiert sein kann, (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkoxy, Carboxyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkoxy-

carbonyl, Amino, Mono- oder Di-(C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-alkylamino, Nitro, Cyano oder Hydroxy substituiert sein können,

und

5

10

R<sup>6</sup> Wasserstoff, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl, das durch Hydroxy oder (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkoxy substituiert sein kann, (C<sub>3</sub>-C<sub>7</sub>)-Cycloalkyl oder (C<sub>6</sub>-C<sub>10</sub>)-Aryl, das bis zu dreifach, unabhängig voneinander, durch Halogen, Nitro, (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkoxy, Carboxyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkoxycarbonyl oder Mono- oder Di-(C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-alkylamino substituiert sein kann, bedeutet,

und ihre Salze, Hydrate, Hydrate der Salze und Solvate.

15

2. Verbindungen nach Anspruch 1,

worin

20

25

R<sup>1</sup> und R<sup>2</sup> an benachbarte Phenylringatome gebunden sind und mit den beiden Ringkohlenstoffatomen gemeinsam einen 5- bis 7-gliedrigen gesättigten Ring bilden, der ein oder zwei Heteroatome aus der Reihe N und/oder O enthalten kann und der ein- oder zweifach, unabhängig voneinander, durch Methyl, das seinerseits durch Hydroxy, (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkoxy oder Phenyl substituiert sein kann, Fluor oder Chlor substituiert sein kann,

R<sup>3</sup> Wasserstoff oder Chlor bedeutet

und

30



$R^4$  (C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkenyl oder (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkyl bedeutet, wobei Alkyl bis zu zweifach, unabhängig voneinander, durch Halogen, Trifluormethyl, Trifluormethylthio, (C<sub>3</sub>-C<sub>7</sub>)-Cycloalkyl, Hydroxy, -CO-NH- $R^6$ , (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkoxy, (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkoxycarbonyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkenyl, (C<sub>6</sub>-C<sub>10</sub>)-Aryl oder 5- oder 6-gliedriges Heteroaryl mit bis zu drei Heteroatomen aus der Reihe N, O und/oder S substituiert sein kann,

wobei

Aryl und Heteroaryl ihrerseits bis zu dreifach, unabhängig voneinander, durch Halogen, Trifluormethyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkyl, das seinerseits durch Carboxyl oder (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkoxycarbonyl substituiert sein kann, (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkoxy, Carboxyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkoxycarbonyl, Nitro, Cyano oder Hydroxy substituiert sein können,

und


$R^6$  Wasserstoff oder (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkyl bedeutet,


und ihre Salze, Hydrate, Hydrate der Salze und Solvate.

3. Verbindungen nach Anspruch 1,

worin

$R^1$  und  $R^2$  an benachbarte Phenylringatome gebunden sind und für eine Gruppe





stehen,

$R^3$  Wasserstoff bedeutet,

5 und

$R^4$  Propenyl, Methyl, Ethyl oder n-Propyl bedeutet, wobei die Alkylreste ihrerseits bis zu zweifach, unabhängig voneinander, durch Hydroxy, Methoxy, Trifluormethyl, Trifluormethylthio, Fluor, Imidazolyl, Pyridyl, Phenyl, das seinerseits wiederum durch Fluor, Cyano, Nitro, Methoxy, Methoxycarbonyl ( $-\text{C}(\text{O})-\text{O}-\text{CH}_3$ ) oder Methoxycarbonylmethyl ( $-\text{CH}_2-\text{C}(\text{O})-\text{O}-\text{CH}_3$ ) substituiert sein kann, Methoxycarbonyl ( $-\text{C}(\text{O})-\text{O}-\text{CH}_3$ ), Amido ( $-\text{C}(\text{O})-\text{NH}_2$ ) oder N-Methylamido ( $-\text{C}(\text{O})-\text{NH}-\text{CH}_3$ ) substituiert sein können,


15

und ihre Salze, Hydrate, Hydrate der Salze und Solvate.


4. Verbindungen nach Anspruch 1,

20 worin

$R^1$  und  $R^2$  an benachbarte Phenylringatome gebunden sind und für eine Gruppe



25



stehen,

$R^3$  Wasserstoff bedeutet,

5 und

$R^4$  Propenyl, Methyl, Ethyl oder n-Propyl bedeutet, wobei die Alkylreste ihrerseits bis zu zweifach, unabhängig voneinander, durch Hydroxy, Methoxy, Trifluormethyl, Trifluormethylthio, Fluor, Imidazolyl, gegebenenefalls durch Methyl substituiertes Thiazolyl, Pyridyl, Phenyl, das seinerseits wiederum durch Fluor, Cyano, Nitro, Methoxy, Methoxycarbonyl ( $-\text{C}(\text{O})-\text{O}-\text{CH}_3$ ) oder Methoxycarbonylmethyl ( $-\text{CH}_2-\text{C}(\text{O})-\text{O}-\text{CH}_3$ ) substituiert sein kann, Methoxycarbonyl ( $-\text{C}(\text{O})-\text{O}-\text{CH}_3$ ), Amido ( $-\text{C}(\text{O})-\text{NH}_2$ ) oder N-Methylamido ( $-\text{C}(\text{O})-\text{NH}-\text{CH}_3$ ) substituiert sein können,


und ihre Salze, Hydrate, Hydrate der Salze und Solvate.

5. Verbindungen nach Anspruch 1,


20

worin

$R^1$  und  $R^2$  an benachbarte Phenylringatome gebunden sind und für eine Gruppe



25



$R^3$  Wasserstoff bedeutet,


5 und

$R^4$  Methyl, Ethyl oder n-Propyl bedeutet, wobei die Alkylreste ihrerseits bis zu zweifach, unabhängig voneinander, durch Hydroxy, Trifluormethyl, Trifluormethylthio, Fluor, Imidazolyl, gegebenenfalls durch Methyl substituiertes Thiazolyl, Phenyl, das seinerseits wiederum durch Cyano, Nitro, Methoxycarbonyl ( $-\text{C}(\text{O})-\text{O}-\text{CH}_3$ ) oder Methoxycarbonylmethyl ( $-\text{CH}_2-\text{C}(\text{O})-\text{O}-\text{CH}_3$ ) substituiert ist, oder Amido ( $-\text{C}(\text{O})-\text{NH}_2$ ) substituiert sein können,

15 und ihre Salze, Hydrate, Hydrate der Salze und Solvate.

6. Verfahren zur Herstellung von Verbindungen der Formel (I), wie in Anspruch 1 definiert, dadurch gekennzeichnet, dass man

20 Verbindungen der Formel (II)



in welcher

die Reste  $R^1$ ,  $R^2$  und  $R^3$  die in Anspruch 1 angegebene Bedeutung haben,

mit Verbindungen der Formel (III)

5



in welcher

10

$R^4$  die in Anspruch 1 angegebene Bedeutung hat und

X für eine Abgangsgruppe steht,

umsetzt.

15

7. Verbindungen der Formel (I), wie in Anspruch 1 definiert, zur Prophylaxe und/oder Behandlung von Erkrankungen.

20

8. Zusammensetzung, enthaltend mindestens eine Verbindungen der Formel (I), wie in Anspruch 1 definiert, und mindestens einen weiteren Hilfsstoff.

25

9. Verwendung von Verbindungen der Formel (I), wie in Anspruch 1 definiert, zur Herstellung von Arzneimitteln zur Prophylaxe und/oder Behandlung von Erkrankungen des Herzkreislaufsystems (kardiovaskulären Erkrankungen).

10. Verwendung von Verbindungen der Formel (I), wie in Anspruch 1 definiert, zur Herstellung von Arzneimitteln zur Prophylaxe und/oder Behandlung von Erkrankungen des Urogenitalbereichs und Krebs.

30

11. Verwendung von Verbindungen der Formel (I), wie in Anspruch 1 definiert, zur Herstellung von Arzneimitteln zur Prophylaxe und/oder Behandlung von

inflammatorischen und neuroinflammatorischen Erkrankungen, neurodegenerativen Erkrankungen und Schmerzzuständen.

- 5      12.      Verwendung von Verbindungen der Formel (I), wie in Anspruch 1 definiert, zur Herstellung von Arzneimitteln zur Prophylaxe und/oder Behandlung von Erkrankungen der Atemwege, von Leberfibrose und Leberzirrhose und Diabetes.



# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/EP 02/02998

## A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7 C07D405/04 C07D405/14 C07D213/85 A61K31/443 A61K31/4433  
A61K31/444 A61K31/4439 A61K31/4418 C07D417/14

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 C07D A61K

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

CHEM ABS Data, EPO-Internal, WPI Data

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	KANDEEL, EZ-EL-DIN M. ET AL.: "The use of activated double bond systems in heterocyclic syntheses" HETEROCYCLIC COMMUNICATIONS, vol. 3, no. 4, 1997, pages 371-380, XP001098754 abstract Seite 371; erster Absatz Seite 374; Verbindung 4 Seite 380; Referenzen ---	1-12
A	EP 0 285 267 A (YAMANOUCHI PHARMA CO LTD (JP)) 5 October 1988 (1988-10-05) page 3, line 4 page 41; examples 42-55 page 48; claim 1 --- -/--	1-5, 7, 8, 12

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

° Special categories of cited documents:

- \*A\* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- \*E\* earlier document but published on or after the international filing date
- \*L\* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- \*O\* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- \*P\* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- \*T\* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- \*X\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- \*Y\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- \*&\* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

28 August 2002

Date of mailing of the international search report

03/09/2002

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Cortés, J

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/EP 02/02998

## C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	WO 94 12493 A (SANDOZ AG (DE)) 9 June 1994 (1994-06-09) page 44 -page 45; claim 2 page 48; claim 10 ---	1-5,7,8, 11
A	WO 99 16766 A (KYOWA HAKKO KOGYO KK (JP)) 8 April 1999 (1999-04-08) abstract page 12; examples 1,3,5,6,8,9; table 1 & WPI Zusammenfassung, AN 199-255054 ---	1-5,7-9, 11,12
A	EP 0 908 458 A (DUPHAR INT RESEARCH BV (NL)) 14 April 1999 (1999-04-14) page 4, line 10 - line 12 page 13; claim 1 ---	1-5,7,8, 11
P,X	WO 02 06237 A (YAMANOUCHI PHARM CO LTD (JP)) 24 January 2002 (2002-01-24) abstract Seite 64; Formel 3 page 64; example 76 Seite 65; Formel 4 page 67; examples 146,147 page 85 -page 88; claims & WPI Zusammenfassung AN 2002-179767 (23) ---	1-12
P,X	WO 01 62233 A (HOFFMANN LA ROCHE (CH)) 30 August 2001 (2001-08-30) abstract page 6, line 20 - line 33 page 110; example 17B page 112 -page 113; examples 23,27 page 127; example 96 page 242 -page 244; claim 1 ---	1-12
P,X	WO 01 25210 A (BAYER AG (DE)) 12 April 2001 (2001-04-12) page 3, line 27 -page 4, line 2 page 43 -page 51 page 52 -page 270; examples page 271 -page 276; claim 1 page 314 -page 315; claims 13-17 -----	1-12

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP 02/02998

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP 0285267	A	05-10-1988	AU 1275188 A EP 0285267 A2 FI 880990 A JP 1207267 A NO 880992 A	08-09-1988 05-10-1988 06-09-1988 21-08-1989 06-09-1988
WO 9412493	A	09-06-1994	CA 2122494 A1 WO 9412493 A1 AU 665040 B2 AU 3082692 A EP 0623129 A1 FI 943489 A JP 7503487 T NO 942744 A PL 172371 B1 RU 2104277 C1 SK 88994 A3	09-06-1994 09-06-1994 14-12-1995 22-06-1994 09-11-1994 22-09-1994 13-04-1995 22-07-1994 30-09-1997 10-02-1998 07-06-1995
WO 9916766	A	08-04-1999	AU 9281298 A WO 9916766 A1	23-04-1999 08-04-1999
EP 0908458	A	14-04-1999	EP 0908458 A1 AU 733526 B2 AU 8607998 A BR 9803497 A CA 2247734 A1 CN 1220265 A CZ 9803030 A3 HU 9802129 A1 JP 11302279 A NO 984380 A NZ 331984 A PL 328754 A1 SK 129498 A3 TR 9801866 A1 US 6090812 A ZA 9808749 A	14-04-1999 17-05-2001 15-04-1999 02-05-2000 24-03-1999 23-06-1999 14-04-1999 28-03-2000 02-11-1999 25-03-1999 28-02-2000 29-03-1999 13-04-1999 21-04-1999 18-07-2000 26-03-1999
WO 0206237	A	24-01-2002	AU 6952901 A WO 0206237 A1	30-01-2002 24-01-2002
WO 0162233	A	30-08-2001	AU 5464301 A WO 0162233 A2 US 2001027196 A1	03-09-2001 30-08-2001 04-10-2001
WO 0125210	A	12-04-2001	DE 19947154 A1 AU 7778000 A BR 0014679 A WO 0125210 A2 NO 20021449 A	04-10-2001 10-05-2001 02-07-2002 12-04-2001 07-05-2002
HU 6608	1		NONE	

## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 02/02998

## A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

IPK 7 C07D405/04 C07D405/14 C07D213/85 A61K31/443 A61K31/4433  
A61K31/444 A61K31/4439 A61K31/4418 C07D417/14

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

## B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 C07D A61K

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

CHEM ABS Data, EPO-Internal, WPI Data

## C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	KANDEEL, EZ-EL-DIN M. ET AL.: "The use of activated double bond systems in heterocyclic syntheses" HETEROCYCLIC COMMUNICATIONS, Bd. 3, Nr. 4, 1997, Seiten 371-380, XP001098754 Zusammenfassung Seite 371; erster Absatz Seite 374; Verbindung 4 Seite 380; Referenzen ---	1-12
A	EP 0 285 267 A (YAMANOUCHI PHARMA CO LTD (JP)) 5. Oktober 1988 (1988-10-05) Seite 3, Zeile 4 Seite 41; Beispiele 42-55 Seite 48; Anspruch 1 --- -/--	1-5, 7, 8, 12

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen☒ Siehe Anhang Patentfamilie

\* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"&amp;" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

28. August 2002

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

03/09/2002

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde  
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Cortés, J

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	WO 94 12493 A (SANDOZ AG (DE)) 9. Juni 1994 (1994-06-09) Seite 44 -Seite 45; Anspruch 2 Seite 48; Anspruch 10 ----	1-5,7,8, 11
A	WO 99 16766 A (KYOWA HAKKO KOGYO KK (JP)) 8. April 1999 (1999-04-08) Zusammenfassung Seite 12; Beispiele 1,3,5,6,8,9; Tabelle 1 & WPI Zusammenfassung, AN 199-255054 ----	1-5,7-9, 11,12
A	EP 0 908 458 A (DUPHAR INT RESEARCH BV (NL)) 14. April 1999 (1999-04-14) Seite 4, Zeile 10 - Zeile 12 Seite 13; Anspruch 1 ----	1-5,7,8, 11
P,X	WO 02 06237 A (YAMANOUCHI PHARM CO LTD (JP)) 24. Januar 2002 (2002-01-24) Zusammenfassung Seite 64; Formel 3 Seite 64; Beispiel 76 Seite 65; Formel 4 Seite 67; Beispiele 146,147 Seite 85 -Seite 88; Ansprüche & WPI Zusammenfassung AN 2002-179767 (23) ----	1-12
P,X	WO 01 62233 A (HOFFMANN LA ROCHE (CH)) 30. August 2001 (2001-08-30) Zusammenfassung Seite 6, Zeile 20 - Zeile 33 Seite 110; Beispiel 17B Seite 112 -Seite 113; Beispiele 23,27 Seite 127; Beispiel 96 Seite 242 -Seite 244; Anspruch 1 ----	1-12
P,X	WO 01 25210 A (BAYER AG (DE)) 12. April 2001 (2001-04-12) Seite 3, Zeile 27 -Seite 4, Zeile 2 Seite 43 -Seite 51 Seite 52 -Seite 270; Beispiele Seite 271 -Seite 276; Anspruch 1 Seite 314 -Seite 315; Ansprüche 13-17 -----	1-12



# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 02/02998

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 0285267 A	05-10-1988	AU 1275188 A EP 0285267 A2 FI 880990 A JP 1207267 A NO 880992 A	08-09-1988 05-10-1988 06-09-1988 21-08-1989 06-09-1988
WO 9412493 A	09-06-1994	CA 2122494 A1 WO 9412493 A1 AU 665040 B2 AU 3082692 A EP 0623129 A1 FI 943489 A JP 7503487 T NO 942744 A PL 172371 B1 RU 2104277 C1 SK 88994 A3	09-06-1994 09-06-1994 14-12-1995 22-06-1994 09-11-1994 22-09-1994 13-04-1995 22-07-1994 30-09-1997 10-02-1998 07-06-1995
WO 9916766 A	08-04-1999	AU 9281298 A WO 9916766 A1	23-04-1999 08-04-1999
EP 0908458 A	14-04-1999	EP 0908458 A1 AU 733526 B2 AU 8607998 A BR 9803497 A CA 2247734 A1 CN 1220265 A CZ 9803030 A3 HU 9802129 A1 JP 11302279 A NO 984380 A NZ 331984 A PL 328754 A1 SK 129498 A3 TR 9801866 A1 US 6090812 A ZA 9808749 A	14-04-1999 17-05-2001 15-04-1999 02-05-2000 24-03-1999 23-06-1999 14-04-1999 28-03-2000 02-11-1999 25-03-1999 28-02-2000 29-03-1999 13-04-1999 21-04-1999 18-07-2000 26-03-1999
WO 0206237 A	24-01-2002	AU 6952901 A WO 0206237 A1	30-01-2002 24-01-2002
WO 0162233 A	30-08-2001	AU 5464301 A WO 0162233 A2 US 2001027196 A1	03-09-2001 30-08-2001 04-10-2001
WO 0125210 A	12-04-2001	DE 19947154 A1 AU 7778000 A BR 0014679 A WO 0125210 A2 NO 20021449 A	04-10-2001 10-05-2001 02-07-2002 12-04-2001 07-05-2002
HU 6608 1		KEINE	